



Bór sosnowy bagienny



inicjalna postać boru bagiennego na torfowisku wysokim we Wdzydzkim Parku Krajobrazowym

Bór bagienny powstaje w wyniku sukcesji na torfowisku wysokim. Jego rozwój na żywym torfowisku jest ograniczony do wąskiego pasa u podstawy kopyty i jej niższych partii. Na torfowiskach, gdzie zaburzone zostały stosunki wodne bór, rozwija się na zboczach kopyty i jej wierzchowinie. Bory bagiennie towarzyszą też zarastającym jeziorom dystroficznym, rozwijając się za pasem otwartych mszarów na granicy z krawędzią mineralną. Na Pomorzu rozwijają się też w stale podtapianych obniżeniach wydym, zarówno śródłądowych jak i nadmorskich. Bory bagiennie mogą same zajmować różnej wielkości powierzchnie lub wchodzić w skład rozległych kompleksów torfowisk. Jest to siedlisko bardzo wrażliwe na wszelkie zmiany stosunków wodnych oraz troficznych. Działania ochronne polegają na zachowaniu reżimu wodnego bądź też przywróceniu właściwych dla siedliska warunków wodnych. Bór sosnowy bagienny podlega ochronie w ramach europejskiej sieci Natura 2000 jako siedlisko priorytetowe.



borówka bagienna *Vaccinium*



bagno zwyczajne *Ledum palustre*



wrosiec bagienny *Erica tetralix*